

~~Uzimajući tačku  $x = \frac{\pi}{4}$ , dobijamo da je  $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{16k^2 - 1} = \frac{1}{2} = \frac{\pi\sqrt{2}}{8}$ .~~

~~3. Funkciju  $f(x) = \sin x \ln \cos \frac{x}{2}$  predstaviti trigonometrijskim FOURIERovim redom na intervalu  $(-\pi, \pi)$ .~~

~~Rezultat.~~  $f(x) = \left(\frac{1}{4} - \ln 2\right) \sin x + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 - 1} \sin nx.$

~~4. Funkciju  $f(x) = x^2 \sin x$  predstaviti kosinusnim FOURIERovim redom na intervalu  $(0, \pi)$ .~~

~~Rezultat.~~  $b_n = 0$ ,  $a_0 = 2\pi = \frac{8}{\pi}$ ,  $a_1 = -\frac{\pi}{2}$ , a za  $n > 1$  imamo da je  $a_n = \frac{4(-1)^{n+1}}{\pi(n^2-1)^3} = 2\pi \frac{(-1)^n}{n^2-1} = \frac{12n^2(-1)^{n-1}}{\pi(n^2-1)^3}$ .

## 2.2 Fourierov integral i transformacija

Postavlja se pitanje šta se događa sa FOURIERovim redom ako puštimo da  $l \rightarrow +\infty$ . Posmatrajmo neprekidnu funkciju  $f(x)$  koja je apsolutno integrabilna na  $\mathbf{R}$ , to jest, integral  $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx < M < +\infty$  konvergira. Neka je  $l > 0$ , proizvoljno odabrano. Posmatrajmo funkciju  $f(x)$ , definisanu na intervalu  $[-l, l]$  i periodično je produžimo. Tada se ona može predstaviti FOURIERovim redom (1), odnosno

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) dt + \frac{1}{l} \sum_{n=1}^{+\infty} \left( \int_{-l}^l f(t) \cos \frac{n\pi t}{l} dt \right) \cos \frac{n\pi x}{l} + \left( \int_{-l}^l f(t) \sin \frac{n\pi t}{l} dt \right) \sin \frac{n\pi x}{l} \\ &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) dt + \frac{1}{l} \sum_{n=1}^{+\infty} \int_{-l}^l f(t) \left( \cos \frac{n\pi t}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} + \sin \frac{n\pi t}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} \right) dt \\ &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) dt + \frac{1}{l} \sum_{n=1}^{+\infty} \int_{-l}^l f(t) \cos \frac{n\pi(t-x)}{l} dt \end{aligned}$$

Neka je  $u_n = \frac{n\pi}{l}$ . Imamo da je  $\Delta u_n = u_{n+1} - u_n = \frac{\pi}{l}$ , te dobijamo da je

$$(6) \quad f(x) = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) dt + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \Delta u_n \int_{-l}^l f(t) \cos u_n(t-x) dt.$$

Kako  $\left| \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) dt \right| \leq \frac{1}{2l} \int_{-l}^l |f(t)| dt \leq \frac{M}{2l} \rightarrow 0$ , kada  $l \rightarrow +\infty$  i kako suma na desnoj strani jednakosti (6) predstavlja integralnu sumu funkcije  $\varphi(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos u(t-x) dt$ , puštajući u (6) da  $l \rightarrow +\infty$ , dobijamo da suma konvergira ka integralu

$$(7) \quad \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} du \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos u(t-x) dt.$$

Koristeći adicioneu formulu  $\cos u(t-x) = \cos ut \cos ux + \sin ut \sin ux$  dobijamo da je integral (7) moguće predstaviti u obliku

$$(8) \quad \int_0^{+\infty} (a(u) \cos ux + b(u) \sin ux) du,$$

gde je

$$(9) \quad a(u) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos ut dt \quad \text{i} \quad b(u) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin ut dt.$$

**Definicija 2.** Neka je  $f(x)$  apsolutno integrabilna funkcija na celom skupu  $\mathbf{R}$ . Integralom (7), odnosno (8) definišemo *FOURIEROV integral*, pri čemu su sa (9) definisani koeficijenti ovog integrala.

Ukoliko je funkcija  $f(x)$  neprekidna zajedno sa izvodnom funkcijom  $f'(x)$ , FOURIEROV integral konvergira ka vrednosti funkcije. Kao i FOURIEROV red, FOURIEROV integral, deo po deo neprekidne funkcije, konvergira ka  $\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$ .

**Napomena.** Može se zaključiti da FOURIEROV integral neparne funkcije ima oblik

$$(10) \quad \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} F_s(u) \sin ux du, \quad \text{gde je} \quad F_s(u) = \int_0^{+\infty} f(t) \sin ut dt.$$

Sa  $F_s(u)$  je označen koeficijent  $b(u)$  i nazivamo ga koeficijentom sinusnog FOURIEROVOG integrala.

Ukoliko je funkcija  $f(x)$  parna, njen FOURIEROV integral ima oblik

$$(11) \quad \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} F_c(u) \cos ux \, du, \quad \text{gde je } F_c(u) = \int_0^{+\infty} f(t) \cos ut \, dt.$$

Sa  $F_c(u)$  je označen koeficijent  $a(u)$  i nazivamo ga koeficijentom kosi-nusnog FOURIERovog integrala. Oznake  $F_s(u)$  i  $F_c(u)$  uvodimo kako bi imali oznake koje odgovaraju narednom delu teksta.

**Kompleksan oblik FOURIERovog integrala.** Kako je funkcija  $\varphi(u)$  parna po promenljivoj  $u$ , tada je FOURIEROV integral moguće predstaviti u obliku

$$(12) \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} du \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos u(t-x) \, dt.$$

S druge strane, zbog neparnosti sinusne funkcije, imamo da je

$$(13) \quad 0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} du \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin u(t-x) \, dt.$$

Sabiranjem (12), sa (13) pomnoženim sa  $-i$ , dobijamo da je

$$(14) \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{iux} du \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iut} \, dt.$$

FOURIERovu transformaciju funkcije  $f(x)$  označavamo sa  $F(u)$  i definisemo integralom

$$F(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iut} \, dt.$$

Iz jednakosti (14) dobijamo da je inverzna FOURIERova transformacija definisana sa

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(u) e^{iux} \, du.$$

Za FOURIERove integrale važi PARSEVALova jednakost

$$(15) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} (f(x))^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(u)|^2 du.$$

Specijalno, za sinusni i kosinusni FOURIEROV integral, važe PARSEVALove jednakosti

$$\int_0^{+\infty} (f(x))^2 dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} (F_s(u))^2 du \quad \text{i} \quad \int_0^{+\infty} (f(x))^2 dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} (F_c(u))^2 du.$$

## Zadaci

**10.** Funkciju  $f(x) = \operatorname{sgn}(x-a) - \operatorname{sgn}(x-b)$  gde je ( $b > a$ ) predstaviti FOURIERovim integralom, a zatim primenjujući dobijeni rezultat izračunati vrednost integrala  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx$ .

**Rešenje.** Kako je  $f(x) = 2$ , za  $x \in (a, b)$ , a u ostalim tačkama funkcija je jednaka nuli, imamo da je

$$a(u) + ib(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)(\cos ux + i \sin ux) du = 2 \int_a^b e^{iux} dx = \frac{2}{iu} (e^{ibu} - e^{iau}).$$

Razdvajanjem realnog i imaginarnog dela dobijamo koeficijente FOURIEROVOG integrala

$$a(u) = \frac{2}{u} (\sin bu - \sin au), \quad b(u) = -\frac{2}{u} (\cos bu - \cos au).$$

Primenom adpcionih formula za sinus razlike, dobijamo FOURIEROV integral polazne funkcije

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(x-a)u - \sin(x-b)u}{u} du.$$

Kako, po DIRICHLETovoj teoremi u tački  $x = b$  integral konvergira ka poluzbiru leve i desne vrednosti funkcije, tačnije ka 1 tada za  $x = b$

dobijamo da je  $\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(b-a)u}{u} du = 1$ , odakle smenom  $(b-a)u = 2t$ ,

dobijamo da je vrednost traženog integrala  $\frac{\pi}{2}$ .

**11.** Funkciju  $f(x) = e^{-a|x|}$  ( $a > 0$ ), predstaviti FOURIERovim integralom, a zatim koristeći dobijeni rezultat izračunati vrednost integrala  $\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax}{a^2+x^2}$ .

**Rešenje.** Kako je funkcija  $f(x)$  parna tada je  $b(u) = 0$ . Imamo da je

$$a(u) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-at} \cos ut \, dt.$$

Nakon dve primene parcijalne integracije, vraćamo se na polazni integral i dobijamo da je

$$a(u) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{a}{a^2+u^2},$$

te kako je funkcija neprekidno diferencijabilna, imamo da je

$$f(x) = \frac{2a}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\cos ux}{a^2+u^2} \, du,$$

što predstavlja FOURIERov integral funkcije  $f$ . Kako integral konvergira ka vrednosti funkcije u tački  $x = a$ , dobijamo da je

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos au}{a^2+u^2} \, du = \frac{\pi e^{-a^2}}{2a}.$$

**12.** Funkciju  $f(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$ , predstaviti FOURIERovim integralom, a zatim izračunati vrednost integrala

$$\int_0^{+\infty} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3} \cos \frac{x}{2} \, dx \quad \text{i} \quad \int_0^{+\infty} \frac{(x \cos x - \sin x)^2}{x^6} \, dx.$$

**Rešenje.** Kako je funkcija parna imamo da je  $b(u) = 0$ . Parcijalnom integracijom dobijamo da je

$$a(u) = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 (1 - t^2) \cos ut \, dt = \frac{1}{\pi} \left( \frac{4 \sin u}{u^3} - \frac{4 \cos u}{u^2} \right).$$

Zbog neprekidnosti funkcije  $f(x)$ , primenjujući FOURIERov integral, dobijamo da je

$$f(x) = -\frac{4}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{u \cos u - \sin u}{u^3} \cos ux \, du.$$

Uzimajući da je  $x = \frac{1}{2}$  dobijamo da je

$$\int_0^{+\infty} \frac{u \cos u - \sin u}{u^3} \cos \frac{u}{2} du = -\frac{3\pi}{16}$$

Primenjujući PARSEVALovu jednakost za kosinusni FOURIEROV integral, dobijamo da je

$$\int_0^{+\infty} \frac{(u \cos u - \sin u)^2}{u^6} du = \frac{\pi}{16} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^2 dx = \frac{\pi^2}{15}.$$

**13.** Dokazati jednakost

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 z}{z^2} \cos 2zx dz = \begin{cases} 1-x, & x \in [0, 1) \\ 0, & x \geq 1 \end{cases}.$$

**Rešenje.** Pokazaćemo da integral na levoj strani jednakosti iz iskaza zadatka predstavlja kosinusni FOURIEROV integral funkcije na desnoj strani jednakosti. U tom cilju dopunimo funkciju sa desne strane jednakosti do parne, pomoću

$$g^*(x) = \begin{cases} 1-x, & x \in [0, 1) \\ x+1, & x \in (-1, 0] \\ 0, & x \in (-\infty, -1] \cup x \in [1, +\infty) \end{cases}.$$

Kako je funkcija  $g^*$  parna, imamo da je  $b(u) = 0$ , dok je

$$a(u) = 2 \int_0^1 (1-t) \cos ut dt = \frac{2}{u^2} (1 - \cos u).$$

Kako funkcija zadovoljava DIRICHLETove uslove, imamo da je

$$g^*(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos u}{u^2} \cos ux du.$$

Uvodeći smenu  $u = 2z$  i koristeći adiciju formulu  $1 - \cos 2z = 2 \sin^2 z$  dobijamo da je

$$g^*(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 z}{z^2} \cos 2zx dz.$$

**14.** Primenjujući FOURIEROVU transformaciju, rešiti integralnu jednačinu

$$\int_0^{+\infty} f(t) \sin ut dt = \begin{cases} 1-u, & u \in [0, 1] \\ 0, & u > 1 \end{cases}.$$

**Rešenje.** Funkcija na desnoj strani integralne jednačine predstavlja sinusnu FOURIEROVU transformaciju nepoznate funkcije  $f(x)$ , te iz jednakosti (10) sledi da je

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} F_s(u) \sin ux \, du = \frac{2}{\pi} \int_0^1 (1-u) \sin ux \, du = \frac{2(x-\sin x)}{\pi x^2}.$$

**15.** Odrediti FOURIEROV integral funkcije  $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < a \\ 0, & |x| > a \end{cases}$ , za  $a \neq 0$ , a zatim primenjujući FOURIEROVU transformaciju, odrediti

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin ua \cos ux}{u} \, du.$$

**Rešenje.** Odredimo FOURIEROV integral u kompleksnom obliku. Imamo da je

$$F(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iut} \, dt = \int_{-a}^a e^{-iut} \, dt = \frac{e^{iua} - e^{-iua}}{iu} = 2 \frac{\sin ua}{u}, \text{ za } u \neq 0.$$

Za  $u = 0$  dobijamo da je  $F(u) = 2a$ . FOURIEROV integral  $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(u) e^{iux} \, du$ , konvergira ka funkciji

$$f^*(x) = \begin{cases} 1, & |x| < a \\ \frac{1}{2}, & |x| = a \\ 0, & |x| > a \end{cases}$$

pri čemu je vrednost funkcije u  $|x| = a$  dobijena DIRICHLETovim kriterijumom. Rastavljanjem realnog i imaginarnog dela, dobijamo da je

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(u) e^{iux} \, du = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin ua \cos ux}{u} \, du + \frac{i}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin ua \sin ux}{u} \, du.$$

Kako je podinetegralna funkcija u drugom integralu neparna, taj integral je nula, te dobijamo da je

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin ua \cos ux}{u} \, du = \begin{cases} \pi, & |x| < a \\ \frac{\pi}{2}, & |x| = a \\ 0, & |x| > a \end{cases}$$

**Zadaci za vežbu**

**5.** Funkciju  $f(x) = \frac{1}{x^2+a^2}$ , za  $a \neq 0$ , predstaviti FOURIERovim integralom.

**Rezultat.**  $a(u) = \pi \frac{e^{-|a|u}}{|a|}$ ,  $b(u) = 0$ . Primeniti kompleksnu integraciju po polovini kruga za nalaženje koeficijenata.

**6.** Funkcije

$$\text{a)} f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 < x \leq 0 \\ 1-x, & 0 < x < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{b)} f(x) = e^{-a|x|} \cos bx, \text{ gde je } a > 0$$

predstaviti FOURIERovim integralom.

**Rezultat.**

$$\text{a)} \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{(1-\cos u) \cos ux}{u^2} du \quad \text{b)} \frac{a}{\pi} \int_0^{+\infty} \left( \frac{1}{(u-b)^2+a^2} + \frac{1}{(u+b)^2+a^2} \right) \cos ux du.$$

**7.** Odrediti sinusni FOURIEROV integral funkcije  $f(x) = e^{-ax}$  za  $a > 0$  koji konvergira na  $(0, +\infty)$  ka funkciji  $f(x)$ .

**Rezultat.**  $b(u) = \frac{2}{\pi} \frac{u}{u^2+a^2}$ .

**8.** Odrediti kosinusni FOURIEROV integral funkcije  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$  koji konvergira na  $(0, +\infty)$  ka funkciji  $f(x)$ .

**Rezultat.**  $a(u) = \frac{1}{\sqrt{u}}$ .

**9.** Primjenjujući FOURIERovu transformaciju, rešiti integralne jednačine

$$\text{a)} \int_0^{+\infty} g(u) \cos xu du = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\text{b)} \int_0^{+\infty} g(u) \sin xu du = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \sin x, & 0 \leq x < \pi \\ 0, & x \geq \pi \end{cases},$$

gde je  $g(u)$  nepoznata funkcija.

**Rezultat.** a)  $g(u) = e^{-u}$ , b)  $g(u) = \frac{\sin \pi u}{1-u^2}$ .

**Inverzna LAPLACEova transformacija.** Da bi odredili *inverznu LAPLACEovu transformaciju* pođimo od FOURIERove transformacije. Sa  $F(p)$  označimo LAPLACEovu transformaciju orginala  $f(t)$ , a sa  $F(u)$  FOURIEROVU transformaciju orginala  $e^{-ct}f(t)$ , gde je  $c$  konstanta. Imamo da je FOURIERova transformacija funkcije  $e^{-ct}f(t)$  jednaka LAPLACEovoj transformaciji funkcije  $f(t)$ , pošto je

$$F(u) = \int_0^{+\infty} e^{-(c+iu)t} f(t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = F(p),$$

gde smo tačku  $c + iu$  označili sa  $p$ . Na osnovu inverzne FOURIERove transformacije dobijamo da je  $e^{-ct}f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{iut} F(u) du$ , odnosno

dobijamo da je  $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{(c+iu)t} F(u) du$ . Kako je  $F(u) = F(p)$

imamo da je  $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{(c+iu)t} F(p) du$ . Uvodeći u poslednjem integralu smenu  $c+iu = p$ , dobijamo inverznu LAPLACEovu transformaciju

$$(2) \quad f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} e^{pt} F(p) dp,$$

pri čemu se integracija vrši po pravoj  $\operatorname{Re}(p) = c$ , gde je  $c$  izabrano tako da se svi konačni singulariteti nalaze sa leve strane prave. Ako su  $p_1, p_2, \dots, p_n$  izolovani singulariteti podintegralne funkcije na osnovu CAUCHYEVE teoreme o reziduumima imamo da je

$$f(t) = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(e^{pt} F(p); p_k).$$

Integral koji određuje inverznu LAPLACEovu transformaciju, označen jednakošću (2), naziva se BROMWICHOV integral.